

# Toxina Botulínica

La toxina botulínica suaviza las líneas de expresión de la frente, el entrecejo y las patas de gallo, con resultados naturales que respetan tu gesto. Sigue estas indicaciones para aprovechar al máximo tu tratamiento y tu recuperación.

## 01 ANTES DEL TRATAMIENTO

- En lo posible, asiste con la piel limpia: sin maquillaje, cremas, protector solar ni aceites en la zona a tratar.
- Evita el consumo de alcohol durante las 24 a 48 horas previas.
- Evita aspirina, ibuprofeno, naproxeno y otros antiinflamatorios los 2 a 5 días previos, siempre que tu médico lo autorice, ya que aumentan el riesgo de hematomas.
- Si tomas anticoagulantes o tienes algún trastorno de la coagulación, infórmalo antes del procedimiento.
- Cuéntanos si tienes heridas, infección o herpes activo, dermatitis, acné inflamatorio, alergias conocidas o sensibilidad importante en la zona.
- Infórmanos si estás en embarazo o lactancia, si tienes enfermedades neuromusculares, alteraciones de la fuerza muscular o antecedente de reacción a la toxina botulínica.
- Si tienes rellenos, hilos tensores u otros procedimientos recientes en la zona, avísanos para definir el momento ideal.
- Lee y firma el consentimiento informado luego de resolver todas tus dudas.

## 02 DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

- Durante las primeras 4 horas, evita acostarte por completo y no masajes, presiones ni manipules la zona tratada.
- Evita el ejercicio intenso, saunas, baños turcos, jacuzzi y el calor intenso durante las primeras 24 horas.
- Evita gorras, cascos, gafas o accesorios que hagan presión sobre la zona las primeras horas, en especial si se trató frente o entrecejo.
- Puedes maquillarte después de 4 a 6 horas, siempre con suavidad y sin frotar la zona.
- Evita la depilación de cejas durante los 8 días posteriores al procedimiento.

### QUÉ ES NORMAL Y QUÉ ESPERAR

Es normal un **enrojecimiento leve, sensibilidad, pequeños puntos** en los sitios de aplicación o hematomas discretos en la zona tratada.

Los primeros efectos se notan alrededor del **quinto día** y el resultado definitivo se evalúa entre los **días 10 y 12**. La duración habitual es de **3 a 5 meses**, según cada paciente, la fuerza de los músculos tratados y la dosis aplicada.

Te esperamos en tu control entre los días 10 y 12: evaluamos la evolución y definimos si se requieren aplicaciones adicionales para optimizar tu resultado.

### CONTÁCTANOS DE INMEDIATO SI

Presentas dolor intenso, dificultad para abrir los ojos, caída marcada del párpado, alteraciones visuales, dificultad para tragar o respirar, reacción alérgica o cualquier síntoma que te preocupe.